


Multiresistente Tuberkulose in Österreich 1997 – 2010 (N = 146)



Quelle: AGES TB-Jahresbericht 2008-2010

Alterststandardisierte Inzidenz der Tuberkulose pro Bundesland 2008, 2009, 2010


Bundesland	2008		2009		2010		Inzidenzveränderung
	N=817 n/N (%)	Inzidenz Fälle/100.000 Einwohner	N=697 n/N (%)	Inzidenz Fälle/100.000 Einwohner	N=688 n/N (%)	Inzidenz Fälle/100.000 Einwohner	
NÖ	137 (16,8)	7,77	112 (16,1)	6,36	81 (11,8)	4,66	2008-2010 - 40%
Salzburg	33 (4,0)	5,81	42 (6,0)	7,17	34 (4,9)	5,64	2009-2010 -21,3%
OÖ	143 (17,5)	9,10	120 (17,2)	7,63	119 (17,3)	7,35	2008-2010 -19,2%
Wien	271 (33,2)	15,36	243 (34,9)	13,34	230 (33,4)	12,75	2008-2010 17%
Kärnten	36 (4,4)	5,57	42 (6,0)	6,37	41 (6,0)	5,76	2009-2010 -9,6%
Burgenland	22 (2,7)	6,46	4 (0,6)	1,08	13 (1,9)	4,33	2009-2010 +300% ¹
Vorarlberg	18 (2,2)	4,69	20 (2,9)	4,71	28 (4,1)	6,77	2008-2010 + 44%
Tirol	65 (8,0)	8,73	38 (5,5)	4,89	50 (7,3)	6,45	2009-2010 + 31,9%
Steiermark	92 (11,3)	6,71	76 (10,9)	5,51	92 (13,4)	6,81	2009-2010 + 23,6%

¹ Angabe 300% ist aus mathematischer Sicht inkorrekt (stattdessen vierfacher Anstieg korrekt); die Angabe wurde dennoch gewählt für den Vergleich der prozentualen Inzidenzveränderung zwischen allen Bundesländern

Quelle: AGES TB-Jahresbericht 2008-2010

Alterskorrigierte bundesländerspezifische Tuberkuloseinzidenz 2010

Folie 3




Quelle: AGES TB-Jahresbericht 2008-2010

TBC-Prävalenz in Europa 2009

TBC-Fälle /100.000 Einwohner


Folie 4



Nach Daten der WHO steht Österreich vor Großbritannien, Spanien und Portugal an 4.-letzter Steller der „alten“ EU-Staaten


WHO-Daten 2011 (<http://apps.who.int/ghodata/?vid=17600&theme=country>)

Entwicklung der Tuberkulose in Europa 2005 bis 2010 (WHO-Daten European Region 2011)



Quelle: <http://www.who.int/tb/challenges/mdr/en/index.html> - Graphs and tables

Mittlere jährliche alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzrate für 1997 bis 2010 (N = 14.593)




Indicators of diagnosis, notification and treatment of drug-resistant TB, by country and

Folie 7

Notified MDR-TB (absolute) - 2010

- [0] No Data
- [1] 0 - 10
- [2] 11 - 50
- [3] 51 - 250
- [4] 251 - 1000
- [5] 1001 +



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.


Copyright - WHO 2011. All rights reserved.



World Health Organization

Global trends in estimated rates of TB incidence, prevalence and mortality

Folie 8



2010: Angestrebtes Ziel der WHO ist die Reduktion der TBC-Mortalität im Jahre 2015 auf 50 % der Todesfälle von 1990

Source: Global Tuberculosis Control 2011 report, WHO.

© WHO. All rights reserved.